

Харківська обласна рада  
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  
Державне управління охорони навколишнього природного середовища  
у Харківській області

**ЧЕРВОНА КНИГА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Тваринний світ**

Харків — 2013

**КАРАПУЗИК ВЕЛИКИЙ***Pachylister inaequalis* (Olivier, 1789)**Карапузик большой**

Клас Комахи — Insecta

Ряд Жуки — Coleoptera

Родина Карапузики — Histeridae

**Природоохоронний статус**

Рідкісний.

**Морфологічна характеристика**

Довжина тіла до 19 мм. Найбільший в Україні представник родини. Верх блискучий, чорний, іноді диск надкрил просвічує червоним. Ліва мандибула самця значно довше правої, сильно вигнута. Верхня губа в самиці поперечно-п'ятикутна, в самця — довше своєї ширини, на вершині округло загострена. Заочні ямки передньоспинки округлі, великі, але неглибокі, зовні обмежені внутрішньою бічною борозенкою, яка злегка вкорочена позаду, а іноді й спереду; зовнішня бічна борозенка тонка, позаду ледь вкорочена; спереду звичайно переходить на передній край, посередині широко перервана, а іноді перервана й у передніх кутів; крайова борозенка трохи не доходить до задніх кутів; епіплеври в коротких, помірно густих стоячих волосках. Надкрила з чітким передвершинним вдавленням; їхні дорсальні борозенки тонкі, неглибокі. Зубці передньої гомілки сильні, її задня поверхня густо зморшкувато-пунктована.

**Ареал виду та його поширення у регіоні**

Степи та напівпустелі всієї Палеарктики. В Україні відсутній у вологих лісових районах; у Харківській області — Харківський, Зміївський, Великобурлуцький, Куп'янський та Дворічанський райони.

**Чисельність**

Нечисленний вид.

**Місця перебування**

Частіше за все — свіжий послід великої рогатої худоби, інколи — на падлі.

**Особливості біології**

Хижак, живиться личинками мух, а також імаго та личинками жуків (*Aphodius*, *Sphaeridium*, *Onthophagus* тощо). Личинки також розвиваються в свіжому посліді копитних тварин. Розвиток проходить досить швидко і завершується у вересні. Дорослі жуки живуть довго, більше року. Трапляються з квітня по вересень.

**Основні чинники зниження чисельності**

Лімітуючі фактори невідомі.

**Заходи охорони**

Охороняється в степових заповідниках півдня України. Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення місць проживання.

**Джерела інформації**

Крыжановский, Рейхардт, 1976.

Автор: О. М. Дрогваленко  
 Фото: © О. І. Слущкий