

**Списокъ растеній, собранныхъ въ прикаспійскихъ
степяхъ Уральской области.**

Г. Доппельмаира (С.-Петербургъ).

**Verzeichnis der, in den Kaspischen Steppen des Ural-
gebiets, gesammelten Pflanzen.**

Von Georg Doppelmaier (St. Petersburg).

Растенія, перечисляемыя въ предлагаемомъ спискѣ, собраны мною лѣтомъ 1900 года, главнымъ образомъ въ предѣлахъ Гурьевскаго уѣзда Уральской области, и приводятся не въ систематическомъ порядкѣ, а по мѣстонахожденіямъ, — что во-первыхъ избавляетъ меня отъ необходимости предварительного изложенія маршрута, а во-вторыхъ этимъ достигается нѣкоторое объединеніе перечисляемыхъ растеній общими физическими особенностями мѣстонахожденій.

Положеніе большинства посѣщенныхъ мною пунктовъ съ достаточной точностью можно опредѣлить по „двадцативерстной карте Оренбургской степи“, изданія Главнаго Штаба, по листамъ VII, VIII и III, IV-му.

Рѣшаясь опубликовать свои краткія замѣтки, лишь ввиду крайней скучности нашихъ свѣдѣній о флорѣ Уральской области, спѣшу принести глубокую благодарность Д. И. Литвинову, любезно опредѣлившему привезенные растенія.

A. Городъ Гурьевъ (устье рѣки Урала).

26/VI. Въ городѣ на пустыряхъ: *Solanum nigrum* L., *Polygonum aviculare* L., *Lotus corniculatus* L., *Zygophyllum Fabago* L.

27/VI. За городомъ на русскомъ кладбищѣ, расположенному на бугрѣ, среди обнаженной глинисто-солонцеватой стени: *Inula britannica* L., *Mulgedium tataricum* D C., *Cynanchum acutum* L., *Glycyrrhiza glabra* L., *Asperula humifusa* M B., *Tamarix Pallasii* a et c., *Allagi camelorum* Fisch.

За городомъ въ степи: *Tournefortia Arguzia* R. et Sch.

B. Среди песковъ, занимающихъ пространство къ юго-востоку отъ устьевъ рѣки Эмбы.

4/VII. Уроч. Кюгюнъ-Мула, глинисто-песчаная солонцеватая степь: *Plantago maritima* L., *Mulgedium tataricum* D C., *Lasiagrostis splendens* Kunth, *Statice cespitosa* Willd.

8/IX. Уроч. Кара-Шагль, плотные песчаные бугры покрываютъ сплошь: *Artemisia maritima* L. var.?

4/VII. Уроч. Джарты-чоку, на болѣе плотной песчаной равнинѣ: *Astragalus Lehmannianus* Bunge., *Allium sabulosum* Stev.

Среди бугристыхъ сыпучихъ песковъ: *Cousinia affinis* Schrenk, *Peganum harmala* L., *Achillea Gerberi* M B., *Syremia siliculosa* Ledeb., *Triticum desertorum* Fisch., *Jurinea cyanoides* Reichenb., *Euphorbia Gerardiana* Jacq.

9/VIII. Кара-Чунгуль (нефтяные источники): *Astragalus virgatus* Pall.

C. Отъ Кара-Чунгула мой путь направляется почти меридіанально, на сѣверъ къ Уильскому укрѣплению, перестъка слѣдующіе пункты:

10/VII. Уроч. Толтыръ-соръ. Берега лишенного растительности солончака (соръ) окаймлены лентой изъ *Statice suffruticosa* L. и *Halocnemum strobilaceum* M B.

12/VII. Тағы мечеть (Киргизская зимовки и мечеть на реке Эмбѣ).
Куръ-Джемъ, старое русло Эмбы: *Goebelia alopecuroides* Bunge.

Поросли на Эмбѣ на островахъ: *Polygonum lapatifolium* L., *Polygonum littoralis* Sm., *Scirpus maritimus* L. var. *compacta*, *Scirpus affinis* Roth.

Правый берегъ Эмбы, на глинистыхъ почвахъ: *Anabasis aphylla* L.
14/VII. У подножья горъ Кой-Кара и Иманъ-Кара разстилается серебристо-серой пеленою полынная степь, *Artemisia maritima* L. var.?

16/VII. На обнаженияхъ бѣлаго мѣла къ сѣверу отъ горы Кой-Кара: *Anabasis cretacea* Pall.

18/VII. Отъ урочища Конраулы холмистую местность покрываетъ ковыль — *Stipa capillata* L.; здесь немного южнѣе 48-ой параллели проходитъ южная граница распространенія ковыля, и далѣе на сѣверъ тянется область ковыльной степи.

27/VII. Вблизи реки Уила: *Artemisia pontica* L., *Pulicaria vulgaris* Gaertn.

Въ окрестности Уильского укрѣпленія ветрѣчаются густыя заросли чая — *Lasiagrostis splendens* Kuntz.

D. 1/VIII. Пески Тайсуйганъ: *Chondrilla juncea* L., *Echinops ritro* L., *Aristida pennata* Trin.

На солонцахъ съ выцвѣтами соли: *Echinopsilon sedoides* Moq., *Statice Gmelini* Willd.

По берегамъ бесплодныхъ солончаковъ (соръ): *Halocnemum strobilaceum* M.B., *Bienertia cycloptera* Bunge.

3/VIII. Уроч. Кійкѣ. Песчаная почва: *Salsola lanata* Pall., *Ceratocarpus arenarius* L.

Е. Къ югу отъ Кійкѣ, по направлению къ колодцамъ Бляули простирается холмистая глинисто-песчаная степь, исключительно покрытая *Ceratocarpus arenarius* L., *Echinopsilon sedoides* Moq. и *Artemisia maritima* L. var.?, изрѣдка попадается *Anabasis aphylla* L. Берега лежащихъ между холмами солончаковъ (соръ) окаймляютъ цвѣтущіе виды *Statice* sp.

5/VIII. Южнѣе Бляули къ нефтянымъ источникамъ Досъ-саръ почва приобрѣтає твердый глинистый характеръ и покрывается сплошь *Brachylepis salsa* C. A. Mey.

Замѣтки о злакахъ Кавказа и Крыма (Поправка).

Г. Вестберга (Рига).

На стр. 154-ой въ Acta H. Jurj. (томъ V, вып. 3) съ 6-ой строчки мелко печатанного послѣ словъ *subsp. vulgaris* должно быть:

1. Листья плоские, очень короткие. Колоски маленькие. Метелка очень раскидистая, сравнительно съ рѣдко сидящими колосками.

2. Листья щетинисто-сложенные.

v a r. *alpina* Horre (A. *Andraei* Auegswald; *convoluta* Trautv.).

3. Листья длинные, плоские (развѣ въ сухомъ видѣ вдоль сложенные):

a) Метелка скатая, съ короткими вѣтвями

v a r. *montana* Rchb.

b) Метелка раскидистая:

а. Кроющія чешуи темно-фиолетовые.

v a r. *varia* Wimm. & Grav.

б. Кроющія чешуи блѣдныя (тѣневая форма).

v a r. *altissima* Moench.