

*L. elymaitica* (Boiss.) Kuprian., объединяемая ранее в один вид с *L. lineolata* Boiss., резко отличается от последней. Вместе с тем ее морфологические особенности так своеобразны, что в настоящий момент трудно установить ее непосредственные генетические связи.

*L. elymaitica* (Boiss.) Kuprian. отличается от *L. lineolata* Boiss. рядом очень существенных морфологических признаков, какими являются: отсутствие бугорков на диске семян, полное отсутствие опушения на чашечке; форма зубцов чашечки и форма соцветия. Остается несомненной принадлежность *L. elymaitica* (Boiss.) Kuprian. к секции *Grandes* и, повидимому, к подсекции *Laeves*.

Секция III. **VERSICOLORES** (Benth.) Wettst. in Pflanzenfam. IV, 3 (1895) 59; Benth. in DC. Prodr. X (1846) 275, pro biv. — Однолетники и многолетники. Семена удлиненные, трехгранные, очень мелкие, 0,5—1 мм дл., по граням морщинистые или крупно-буторчатые; соцветие метельчатое или колосовидное. Венчик белый, голубой, лиловый или серо-фиолетовый. Листья очередные или мутовчатые.

Из этой секции, широко представленной в западном Средиземноморье, во флоре СССР имеется всего 6 видов.

43. **L. chalepensis** (L.) Mill. Dict. (1768) n° 12; Boiss. Fl. or. IV (1879) 381; Гросг. Фл. Кавк. III (1932) 370. — *Antirrhinum chalepense* L. Sp. pl. (1762) 859. — **Ic.:** Sibth. et Sm. Fl. Graeca (1826) 73, t. 592.

44. **L. armeniaca** Chav. Monogr. (1833) 147; Ldb. Fl. Ross. III (1847—1849) 210; Boiss. Fl. or. IV (1879) 381; Гросг. Фл. Кавк. III (1932) 370. — *L. segatalis* C. Koch in Linnaea, XVII (1843) 286. — **Exs.:** Herb. Fl. Cauc. n° 530.

*L. chalepensis* (L.) Mill., *L. armeniaca* Chav. являются дикорастущими видами одного ряда.

Кроме того, из секции *Versicolores* (Benth.) Wettst. в СССР культивируются в садах следующие виды.

45. **L. canadensis** (L.) Du Mont de Courst. bot. cult. II (1802) 96; Chav. Monogr. (1833) 149; Федч. и Флер. Фл. Европ. Росс. III (1911) 852; Маевский, Фл. средн. полосы Европ. ч. СССР (1940) 638. — *Antirrhinum canadense* L. Sp. pl. II (1753) 618.

46. **L. bipartita** (Vent.) Willd. Enum. Hort. berol. II (1809) 640; Chav. Monogr. (1833) 145; Федч. и Флер. Фл. Европ. Росс. III (1911) 852; Hegi, III. Fl. VI (1918) 23; — *Antirrhinum bipartitum* Vent. Discript. pl. Nouvel. jard. Cels (1800) 82, t. 82.

47. **L. corifolia** Desf. Choix de Pl. du cor. Tourn. (1808) 32, t. 22; Chav. Monogr. (1833) 153. — *L. cordifolia* Boiss. Fl. or. IV (1879) 379; Гросг. Фл. Кавк. III (1932) 369. — *L. dschorochensis* C. Koch in Linnaea, XXII (1849) 718. — *L. corrugata* S. Kar. ex Гросг. Опред. (1949) 305.

*L. corifolia* Desf. встречается по каменистым склонам гор в Армии. ССР и в Малой Азии.

48. **L. monspessulana** (L.) Mill. Gard. dict. (1768) n° 9; Hegi, III. Fl. Mitt.-Europ. VI (1918) 22. — *Antirrhinum monspessulanum* L. Sp. pl. (1762) 854. — *A. striatum* Lam. Fl. franc. II (1778) 343. — *L. striata* DC. Prodr. X (1846) 278; Ldb. Fl. Ross. III (1847—1849) 210 p. p.

Секция IV. **DIFFUSAE** (Benth.) Wettst. in Pflanzenfam. IV, 3 (1895) 59. — Однолетники и многолетники. Семена продолговато-почковидные, сжатые с спинной части и утолщенные с внешнего края, реже семена угловатые, без края; цветки часто расположены в пазухах листьев или соцветие метельчатое. Венчик белый, голубой или желтый. Листья мутовчатые.

Виды этой секции распространены в западном Средиземноморье. В СССР из них встречается как сорняк в Зап. Закавказье *L. reflexa* (L.) Desf.

Повидимому к этой же секции относится *L. japonica* Miq., растущая на Дальнем Востоке СССР и в Японии.

49. ***L. reflexa*** (L.) Desf. Fl. Atl. II (1800) 42; Boiss. Fl. or. IV (1879) 386; Гросг. Фл. Кавк. III (1932) 370. — *Antirrhinum reflexum* L. Sp. pl. II (1762) 857; Sibth. Ic. Fl. Graeca (1826) t. 593, 74.

50. ***L. japonica*** Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II (1865—1866) 115; Комар. и Алис. Опред. раст. Дальневост. края, II (1932) 918.

Подсекция I. CRETACEAE Klok. в Бот. журн. XXXIV (1949) 75 pro ser. — Многолетники. Семена удлиненные, плоские, полулунной формы, морщинистые. Венчик мелкий, 5—8 мм дл. (без шпоры). Листья мутовчато расположены. Растения мелов Европейской части СССР и Зап. Казахстана.

Подсекцию составляет ряд следующих видов.

51. ***L. cretacea*** Fisch. ex Spreng. Syst. II (1825) 791; DC. Prodr. X (1846) 285; Фл. юго-востока, VI (1936) 196. — *L. menisperma* Klok. в Бот. журн. XXXIV (1949) 70.

52. ***L. creticola*** Kuprian. sp. nova.

53. ***L. macrophylla*** Kuprian. sp. nova.

М. В. Клоков считает эти три меловые вида очень близкими к *L. sabulosa* Czern. Другую точку зрения высказывает Бентам [Prodr. DC. X (1846) 285], относя южнорусские меловые виды к западно-средиземноморской секции *Diffusae*, с которой они сходны по строению семян, ветвлению стеблей и мутовчатому листорасположению. Мы оставляем эти виды в секции *Diffusae*, но в качестве особой подсекции, подчеркнув этим их обособленность.

Секция V. ARVENSES (Benth.) Wettst. in Pflanzenfam. IV, 3 (1895) 59; Benth. in DC. Prodr. X (1846) 279. — Однолетники. Семена дисковидные, со слегка зазубренным или бахромчатым краем, на диске гладкие или бугорчатые. Соцветие большей частью головчатое или компактное, удлиненное. Венчик мелкий, белый, голубой, желтый или пурпурово-фиолетовый. Листья мутовчатые.

54. ***L. arvensis*** (L.) Desf. Fl. Atl. (1800) 45; DC. Prodr. X (1846) 280; Szafer. Rosl. Polsk. (1924) 496; Федч. и Флер. Фл. Европ. Росс. III (1911) 850; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Europ. VI (1918) 23. — *Antirrhinum arvense* L. Sp. pl. II (1762) 855.

55. ***L. turcomanica*** Kuprian. sp. nova.

56. ***L. simplex*** Willd. DC. in Fl. Franc. III (1815) 588; M. Bieb. Fl. taur.-саус. II (1808) 74; Ldb. Fl. Ross. III (1847—1849) 210; Федч. и Флер. Фл. Европ. Росс. III (1911) 850; Гросг. Фл. Кавк. III (1932) 371; Hegi, Ill. Fl. Mittl.-Europ. VI (1918) 23. — *Antirrhinum arvense* L. Sp. pl. II (1762) 855. — *A. simplex* Willd. Sp. pl. III (1800) 243. — *L. arvense* L. Desf. Fl. Atl. (1800) 45; Chav. Monogr. (1833) 157.

57. ***L. micrantha*** (Cav.) Hoffmg. et Link. Fl. Port. I (1809) 258; Spreng. Syst. II (1825) 794; Chav. Monogr. (1833) 156; Ldb. Fl. Ross. III (1847—1849) 210; Boiss. Fl. or. IV (1879) 375; Гросг. Фл. Кавк. III (1932) 370. — *Antirrhinum micranthum* Cav. Ic. I (1791) 51, рис. 69. — *L. simplex* M. Pop. в Тр. Пенз. общ. люб. естествоzn. (1916) 9, ном. DC.

К этой же секции относится также и *L. Pelisseriana* (L.) DC. Последняя резко отличается по строению соцветия и плоско-выпуклых, с бахромчатым краем семян. В СССР *L. Pelisseriana* (L.) DC. была собрана в Закавказье Ледебуром и с тех пор ее никто не собирал.

58. ***L. Pelisseriana*** (L.) DC. Fl. Franc. III (1815) 589; Chav. Monogr. (1833) 154; Ldb. Fl. Ross. III (1847—1849) 210; Boiss. Fl. or. IV (1879)