

вовсе не доразвиваются. Вторая кроющая чеш. вдвое длиннѣе первой, всегда снабженной только одной жилкой. Метелка до 20 см. дл. **A. flavescens** L. (По всему Кавказу).

- V. E. 1. Соцвѣтіе — раскидистая широкая сильно вѣтвистая метелка. Кроющ. чеш. съ 6—9 жилками. **A. dubia** Leegs. (По всему Кавказу).
 2. Соцвѣтіе — сжатая метелка съ сильно укороченными вѣтвями, напоминающая колосья. Кроющ. чеш. съ 1—3 жилками. **A. macra** Stev. (Закавказье).

Замѣтка о нѣкоторыхъ новыхъ или болѣе рѣдкихъ видахъ Харьковской и Воронежской губерній.

Гр. Ширяева (Харьковъ).

Харьковская губ., Старобѣльск. у.

Acer platanoides L. Изрѣдка въ лучше сохранившихся лѣсахъ: Курячевка, Марковка, Ново-Бѣлая. Тан菲尔евъ (Гео.-бот. изслѣдов. въ степной полосѣ, въ Трудахъ лѣс. эксп., снаряж. Лѣс. Деп. стр. 30) не наблюдалъ этотъ видъ клена въ Стрѣб. у.

Alisma arcuatum Michal et. Бѣлолуцкая. Не показано для Харьк. г.

Adoxa moschatellina L. Курячевка, Марковка.

Astragalus testiculatus Pall. Лимаревская цѣлина, Курячевка-склоны.

A. vimineus Pall. Мѣль, Ново-Бѣлая. Не показано для Харьк. г.
Campanula Steveni M.B. Опушки, Зориковка — Курячевка.

Cystopteris fragilis L. Марковка.

Euphorbia falcata L. Староб., Зориковка, Курячевка.

E. leptocaula Boiss. Быхоловъ лѣсъ (Н. Бѣлая).

Hedysarum polymorphum Led. Мѣль, Ново-Бѣлая. (Опр. В. И. Таліевъ). Не показана для Харьк. г.

Scutellaria alpina L. var. *lupulina*. Степной склонъ (близка мѣл. подпочва) по дорогѣ Павловка — Бѣлолуцкая.

Silene cretacea Fisch. Мѣль, Ново-Псковъ. Единственное мѣстонахожденіе въ уѣздѣ. Экземпляръ въ герб. Чернигова (Харьк. Ун.) взятъ отсюда.

Veronica incana L. var. *canescens* Schrad. Быхоловъ лѣсъ (Н. Бѣлая). Не показана для Харьк. губ.

Воронежская губ.

Berberis vulgaris L. Мѣль, Грушевка.

Carex distans L. Расково; не показано для Воронеж. г.

Clematis recta L. Богучарь.

Crambe tatarica Jacq. Ibid.

Brassica armoracoides Czernw. Ibid. Не показано для Ворон. г.

Dianthus pseudarmeria M.B. Ibid. Не показано для Ворон. губ.

Dictamnus fraxinella L. Ст. Михайловка. Не показ. для Ворон. г.

Euphorbia leptocaula Boiss. Ibid.

Cuscuta planiflora Ten. Журавка. Не показ. для Ворон. г.

C. epithymum Murr. Мъль, Богучаръ. Не показано для Ворон. губ.

Chrysanthemum millefoliatum L. Богучаръ. Не показано для Ворон. губ.

Genista tinctoria L. var. *angustifolia* Led. Мъль, Гороховка. У Дубянского [„О характерѣ растит. мъл. обнаж.“, въ Изв. Спб. Бот. Сада, III, 7, 903. ¹], повидимому, sub *G. depressa* M.B. Показаніе *G. tinctoria* L. var. *ang.* Мельгунова („Конспектъ сосуд. раст., собр. въ окрестностяхъ г. Воронежа“, въ Труд. Харьк. Общ. Ест. т. XXI, стр. 23) для песковъ, по всей вѣроятности, ошибочно.

Isatis tinctoria L. Михайловка, полотно ж. д.

Orchis laxiflora Lam. Расково. Не показано для Ворон. губ.

Plantago Cornuti Gouan. Ibid. Не показ. для Ворон. губ.

Xeranthemum annuum L. Богучаръ.

Дополненіе къ списку растеній въ „Очеркѣ растительности юго-восточной части Курской губ.“

В. Н. Сукачева ²⁾.

I. Паллона (Бѣлгородъ).

Мной были найдены въ 1903 и 1904 годахъ:

1) *Orchis laxiflora* Lam. На болотѣ у дер. Титовки, Бѣлгор. у.

2) *Potentilla reptans* L. На лугу у деревни Титовки, Бѣлгор. у.; у г. Бѣлгорода.

3) *Pirola umbellata* L. Въ сосновомъ лѣсу у дер. Титовки, Бѣлгор. у. — *Pirola umbellata* приводится проф. Калениченко для Бекарюковки, но потомъ никакъ не была найдена.

4) *Gentiana pneumonanthe* L. На холмѣ у дер. Крюкова, Бѣлгородск. у.

5) *Poa bulbosa* L. (не живородящая форма). На Бѣлой горѣ, у г. Корочи.

6) *Carex Pairaei* F. Schultz. Въ Архиерейской рощѣ, у г. Бѣлгорода.

7) *Carex rhizodes* Blytt = *C. pediformis* C. A. Mey., которая приводится Шмальгаузеномъ для Корочанского уѣзда. Я нашелъ ее на мѣловомъ обрывѣ у дер. Пушкарной, у г. Бѣлгорода.

8) *Atriplex hastatum* L. var. *microspermum* W. K. На берегу Дона, у Бѣлгорода.

1) См. также Тр. Ю. Б. С. т. V, вып. 3, стр. 170--171.

2) См. Тр. Ю. Б. С. Т. V, вып. 1, стр. 42--45.

9). *Festuca agundinacea* Schreb. var. *aristitata*.
На песчаномъ склонѣ у деревни Бекарюковки Корог. у.
Там же я нашел *Astragalus sulcatus* L., ранее
указанный Неструевымъ для этого места.
Распространение № 1-3 моихъ Отчетовъ послано В. И. Сукачеву,
а 5-9 определены Dr. И. Лебедевымъ.